



## Köprücük kemiği (Klavikula) kırıkları



**Hazırlayan: Suat Ulutaş**

Genellikle düşmeler, spor aktiviteleri veya trafik kazaları gibi travmatik olaylar sonucunda oluşur. Kırık belirtileri; ağrı, omuz ve üst kol hareketlerinde kısıtlılık, şişlik, morarma ve şekil bozukluğudur. Doktorunuz muayene ve gerekirse grafi çekerek kırığın tanısı koyabilir. Genelde kolun askı ve bandaja alınması yoluyla tedavi edilirler. Genelde çocuğun yaşına bağlı olarak 3-4 haftada iyileşir. İyileşme esnasında o bölgede oluşan yenik kemik dokusu dışarıdan belli olan bir şişlik yapar. Bu şişlik zaman içinde giderek azalır ve 1 yıl içinde normale döner. Genel olarak sorun oluşturmadan iyileşirler. Çok nadiren ameliyat tedavisi gerekebilir.

Bandaj ya da askı uygulaması esnasında kol, el ve parmakların şişliği kontrol edilmelidir. Özellikle 8 bandajı uygulaması koltuk altını içine aldığı için damar basısı yaratabilir. El ve parmaklarda şişme olursa bandaj sökülmeli ve hekime başvurulmalıdır.